

LIVISTO für TSEFALEN

Wie könnte man ein Medikament bewerben, das sich für Hunde und Katzen eignet und lecker schmeckt? Die Antwort: Genau so! Graphisch wurden hier Hund und Katze penibel genau zusammengesetzt. Reizvoll machen das Ganze die unterschiedlichen Fellfarben sowie die Kombination aus Schlappohr beim Hund und stehendem Ohr bei der Katze. Die Krönung setzt dem Ganzen der Klebezettel mit der schleckenden Zunge auf. Er gilt für beide Bildhälften und verfremdet die Tierkopf-Komposition noch einmal. Da muss man einfach hinschauen.

LIVISTO

DAS EINZIGE FLÜSSIG ANZUWENDEnde CEFALEXIN

TSEFALEN
50 mg/ml

Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Hunde (bis 20 kg) und Katzen

flüssig + lecker = einfache Verabreichung und gute Akzeptanz
Einsatz ohne Resistenztest nach TÄHAV*

aktuelle Novelle der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) – geändert am 21.02.2018 – ist für den Einsatz von Cefalexin ein Antibiotogramm nicht zwingend erforderlich.

TSEFALEN 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Hunde bis 20 kg und Katzen. Wirkstoff: Cefalexin. **Zusammensetzung:** Cefalexin (als Cefalexin-Monohydrat) 50 mg/ml. **Anwendungsgebiete:** Hunde: Zur Behandlung von bakteriellen Infektionen der Atemwege, der Harn- und Geschlechtsorgane und der Haut, örtlich begrenzten Infektionen des Weichteilgewebes und Infektionen des Magen-Darm-Traktes, die durch Cefalexin-empfindliche Erreger verursacht werden. Katzen: Zur Behandlung von bakteriellen Infektionen der Atemwege, der Harn- und Geschlechtsorgane und der Haut und örtlich begrenzten Infektionen des Weichteilgewebes, die durch Cefalexin-empfindliche Erreger verursacht werden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff, anderen Cephalosporinen, anderen Substanzen aus der Gruppe der Beta-lactam-Antibiotika oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Kaninchen, Rennmäusen, Meerschweinchen und Hamstern. Trächtigkeit und Laktation; Die Trächtigkeit während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung. **Nebenwirkungen:** Nach der Anwendung von TSEFALEN enthaltenden Tierarzneimitteln wurden bei Katzen sehr häufig leichtes und vorübergehendes Erbrechen sowie leichter und vorübergehender Durchfall beobachtet, auch bei dem niedrigsten empfohlenen Dosierungsregime. Die Symptome waren bei den meisten Katzen ohne symptomatische Behandlung reversibel. Bei Hunden, die mit Cefalexin enthaltenden Tierarzneimitteln behandelt wurden, wurde gelegentlich Erbrechen beobachtet. Wie bei anderen Antibiotika kann auch Durchfall auftreten. Bei wiederkehrendem Erbrechen und/oder Durchfall ist die Behandlung abzusetzen. In sehr seltenen Fällen kann es nach der Gabe des Tierarzneimittels zu Übelkeit kommen oder Überempfindlichkeit auftreten. Bei Überempfindlichkeitsreaktionen Behandlung absetzen. **Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber:** I.C.F. srl, Via G.B. Benzoni, 50 - 26020 Palazzo Pignano, Cremona, Italien. **Mitvertreiber:** aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, D-48308 Senden-Bosenfeld, Stand: 11/2020

long with you

aniMedica GmbH - a LIVISTO company - Im Südfeld 9 · 48308 Senden livisto.com

FaktenSchmied-Fazit:

Ein Bild, das alles sagt.