

Virbac für Ypozane®

"Nehmen Sie Prostataprobleme ernst." Das wird Männern seit x Jahren geraten. Und genau das nutzt Virbac nun, um es auf die tierische Zielgruppe der Hunde zu übertragen. Herrchen (und Frauchen) sollen die Probleme ihres Vierbeiners ebenfalls nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Headline wird ideal durch das Bild ergänzt, auf dem der Hund den Kopf leicht hängen lässt, während der Mann verständnisvoll seine Hand auf den Hunderücken legt – wie bei zwei alten Freunden.

Ypozane®
WIRKSTOFF OSATERONACETAT

Nehmen Sie seine Prostataprobleme ernst!

Wirkung für mind. 5 Monate!

Ypozane® 1,875 mg
Ypozane® 3,75 mg
Ypozane® 7,5 mg
Ypozane® 15 mg

Schnelle, deutliche und langfristige Reduktion der klinischen Symptome durch:

- Hemmung der Testosteronaufnahme der Prostata und Reduktion der Androgenkonzentration in der Prostata
- Kompetitive Antagonisierung von Testosteron an den Androgenrezeptoren in der Prostata

Sicher und gut verträglich, auch für Rüden im Deckeinsatz.

Ypozane 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg, 15 mg Tabletten für Hunde (Küsten). Wirkstoff: Osateronacetat. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: je Tablette 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg oder 15 mg Osateronacetat, sonstige Bestandteile: Lactose-Hemihydrat, vorverkleinerte Stärke, Carboxymethylcellulose, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Behandlung der benignen Prostatohyperplasie (BPH) bei Rüden. Gegenanzeigen: Keine. Nebenwirkungen: Vorübergehende Änderungen des Appetits – entweder gesteigert (sehr häufig) oder vermindert (sehr selten) – können beobachtet werden. Vorübergehende Änderungen im Verhalten des Tieres wie eine erhöhte oder verminderte Aktivität oder auch ein sustanzlos verhalten werden häufig beobachtet. Andere Nebenwirkungen wie vorübergehendes Erbrechen und/oder Durchfall, Polyurie/Polydipsie oder Lethargie treten selten auf. Eine Hyperplasie der Milchdrüsen tritt selten auf und kann sehr selten mit einer Laktation verbunden sein. Vorübergehende Änderungen des Haarzustands wie Haarausfall oder Haarveränderungen wurden sehr selten nach der Gabe von Ypozane beobachtet. Bei den meisten behandelten Tieren wird eine vorübergehende Abnahme des Plasma-Cortisol beobachtet. In den klinischen Studien wurde die Behandlung mit dem Arzneimittel nicht abgebrochen und alle Hunde erholten sich ohne spezifische Therapie. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Pharmazeutischer Unternehmer: VIRBAC S.A., 1ère avenue - 29650 m - LD, 65216 Carroz, France. Vertrieb: Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, D-23843 Bad Oldesloe. Verschreibungspflichtig.

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20 · 23843 Bad Oldesloe
info@virbac.de · de.virbac.com

Shaping the future of animal health **Virbac**

FaktenSchmied-Fazit:

Hier findet Wuffi ein offenes Ohr für seine Probleme.